

مجموعه مقالات پژوهشی سینار تازه های پرستاری و مامایی

۱۹، ۱۸ آذمه ۸۸ - دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده آزاد اسلامی واحد خوارگان
دانشکده پرستاری و مامایی

عنوان : بررسی تاثیر آگاهی مادران باردار در خصوص تغذیه دوران بارداری بر تولد نوزاد کم وزن (LBW) در مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۷

نویسنده‌گان: نادیا رحیمی (کارشناس مامایی مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان) – نفیسه آهنی (کارشناس مامایی مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان) – دکتر فاطمه سخنوری (پژوهش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان)

مقدمه: دوران بارداری تغییرات فیزیولوژیک زیادی را در بدن مادر بوجود می آورد. عوامل متعددی در شکل گیری روند صحیح بارداری ونتیجه آن موثر هستند یکی از مهمترین این عوامل، تغذیه مادر باردار است زیرا رشد و نمو جنین با تغذیه مادر ارتباط تنگانگ دارد میزان بروز تولد نوزاد کم وزن (LBW) یکی از شاخص‌های بهداشتی است نوزادانی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد می‌شوند بیشتر در معرض ابتلاء به سوء تغذیه و بیماری‌های مختلف بوده و خطر مرگ و میر در آنان بیشتر از نوزادانی است که با وزن طبیعی متولد شده‌اند بطوریکه دوسوم کل مرگ‌های نوزادی مربوط به نوزادان کم وزن و موالید زود هنگام است. رابطه بین وزن هنگام تولد و میزان رشد آینده کودک مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته و تحقیقات نشان داده است که اگر چه نوزادان با وزن کم تولد در دوران نوزادی رشد سریعتری دارند، ولی به وزن وقوعی که نوزادان متولد شده با وزن طبیعی دست خواهند یافت، نخواهند رسید. بطوریکه این نوزادان در دوران نوجوانی و بزرگسالی از همسالان خود کوتاه‌تر می‌باشند دانش مادر در زمینه رعایت تنوع و تعادل در بارداری و نقش آن در وزن گیری مناسب نوزاد، سهم مهمی در تأمین سلامت مادر و نوزاد دارد.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی است که داده‌های آن از طریق ابزارهای پایش impac و شاخص‌های ذیج حیاتی استخراج گردیده است جمعیت مورد مطالعه از بین مادران زایمان کرده طی شش ماه قبل از انجام پایش انتخاب گردیده اند و بدین منظور در هر خانه بهداشت از بین مادران زایمان کرده ۶ مادر بصورت تصادفی انتخاب و از طریق مصاحبه آگاهی مادران منتخب در خصوص تغذیه دوران بارداری و نحوه صحیح مصرف مکمل‌ها بررسی گردیده است و داده‌های مربوطه در نرم افزار پایش impac ثبت و توسط همان نرم افزار تحلیل گردیده است.

نتایج: آمار نشان میدهد که میزان آگاهی مادران باردار در خصوص تغذیه دوران بارداری و نحوه صحیح استفاده از مکمل‌های دوران بارداری در طی سالهای ۸۶ و ۸۷ در خانه‌های بهداشت از ۷۳ درصد به ۱۰۰ درصد و تولد نوزاد کم وزن از ۱۰/۹۳ در صد به ۹/۰۷ درصد رسیده است.

بحث ونتیجه گیری: بررسی ها نشان میدهد در هر سال ۲۲ میلیون نوزاد با وزن کم هنگام تولد در کشورهای در حال توسعه به دنیا می آیند. در حدود ۱۷ درصد از نوزادان به دنیا آمده در هر سال، کمتر از ۲۵۰۰ گرم وزن دارند که بیشتر آنان متعلق به کشورهای در حال توسعه می باشند در سال ۱۹۹۰، ۲۴ میلیون نوزاد با وزن هنگام تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم به دنیا آمده اند که ۹۰ درصد آنان در کشورهای در حال توسعه متولد شده‌اند. آمار مربوط به مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان حاکی از آن است که افزایش دسترسی به خدمات مراقبتی و آموزشی به زنان باردار در طول دوران بارداری و نیز ارتقا آگاهی در زمینه تغذیه و مکمل یاری در دوران بارداری گامی موثر در ارتقا شاخص‌های سلامت بخصوص کمبود وزن هنگام تولد می‌باشد که بایستی به عنوان راهکاری موثر در پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن مد نظر قرار گیرد.

لغات کلیدی: impac (مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران)